

ENSAYO FERTIMAR 2020 UGARTECHE

Espaldero cordón Royat 2,2 metros entre planta; 1,25 mts entre plantas, variedad malbec
cuartel 5

Localidad Ugarteche LUJAN DE CUYO

DESCRIPCION


Se aplicó Fertimar en dos oportunidades 500gr a 20 días de brotación y 500gr a 50% de floración.

OBJETIVO

Ver si el producto tuvo incidencia en el cuaje de la variedad y por consiguiente en el peso final de Racimo

RESULTADOS

	Fertimar	testigo
peso de racimo	105	93
numero de grano	58	52
peso de grano	1.8	1.8
Semillas por grano	1.8	1.8



CONCLUSION

Se observa una tendencia como en todos los otros casos a un mayor peso de racimos, dado en este caso por una mayor cantidad de granos.

Es de hacer notar que como en los ensayos restantes las variables con Fertimar mostraron menor dispersión en todas las Variables

Imagen 1 Fertimar



Imagen 2 Testigo



En estas imágenes no es clara la diferencia de bayas mal cuajadas, por lo que decidimos no hacer el porcentaje de millerandage, pero si tuvimos diferencias en el peso de racimos y numero de bayas.

Ing. Agr. Leandro Moreno